

阳和汤治验 4 则

★ 董春发 (江西省乐安县牛田卫生院 乐安 344300)

关键词:阳和汤;验案

中图分类号:R 289.5 文献标识码:B

阳和汤出自清·王洪绪《外科全生集》,由熟地黄一两、白芥子二钱、鹿角胶三钱、肉桂一钱、炮姜炭五分、麻黄五分、甘草一钱组成。主治骨槽风、流注、阴疽、脱骨疽、鹤膝风、乳岩、结核、石疽、贴骨疽及漫肿无头、平塌白陷、一切阴凝等症。有温补和阳、散寒通滞之效,临症对的,疗效确凿,现举 4 则于次。

1 髂腰肌脓肿

董某,男,26 岁,未婚。2002 年 8 月 6 日初诊。主诉:腰骶痛半月余。在外地打工数年,于 7 月 17 日午夜卒发左臀腰骶部疼痛,伴放射至下肢痛,发热,即到当地对症治疗疗效不显,3 天后返回本县医院治疗,CT 提示为腰椎间盘突出症,建议手术治疗,患者不从,转省城某医院住院治疗,血检 WBC $9.76 \times 10^9/L$,RBC $4.32 \times 10^{12}/L$,血 Hb 123 g/L,血沉 72 mm/小时,抗 O(-),类风湿因子(-)。CT 确诊为髂腰肌脓肿。住院治疗 8 天后疼痛减轻,要求出院。后转诊于余。刻诊:腰骶、左臀胀痛,牵掣左下肢痛,扶拐跛行,不能下蹲,左臀漫肿无头,不红不硬,体瘦,眼睑淡红,面色萎黄,掌指萎黄淡白,舌苔白滑嫩,脉滑有力。中医辨证为贴骨疽,证属阴毒内盛,阳虚无力托毒外达。治以温补托毒、散寒通滞、通阳止痛,拟阳和汤加味:熟地黄 12 g,麻黄 6 g,白芥子 10 g,鹿角胶 8 g(另烔),肉桂 3 g,炮姜炭 4 g,生黄芪 100 g,皂角刺 10 g,牛膝 15 g,甘草 5 g。水煎,日服 1 剂。8 月 16 日诊,血沉降至 18 mm/小时,诸症日见减轻,守上方辨证选用制川、草乌,地龙,蜈蚣,炮山甲,附片,浙贝母等,日服 1 剂,诸症逐日减轻。9 月 11 日开始下地劳动,诸症基本消失,仍守上方加减出入,服药至 9 月 24 日。9 月 25 日赴省城原诊治医生处复查:血液化验未见异常,CT 复查:脓肿已全部吸收,未见异常肿块影,盆腔未见积液,局部骨质未见破坏,平扫未见异常 CT 征象。病已痊愈。

2 髌关节扭伤

刘某,男,60 岁,农民。1998 年 10 月 31 日诊。秋收背打谷机时扭伤左髌关节,当晚洗冷水浴后髌部疼痛加剧,用中草药治疗 13 天罔效。疼痛呈进行性加重,功能活动明显受限,扶拐跛行,患髌漫肿无头,肤色不红不硬,喜温喜按,轻轻拍打则舒,舌苔薄嫩,脉沉细。拟诊为寒疽,治以散寒通滞,温阳止痛,用阳和汤加味:熟地黄 12 g,麻黄 6 g,白芥子

10 g,鹿角胶 8 g,炮姜炭 4 g,肉桂 4 g,牛膝 15 g,制乳香、没药各 6 g,皂角刺 10 g,生黄芪 30 g,甘草 3 g,水煎,日服 1 剂。服 2 剂后痛减,可弃拐步行,守原方黄芪加重至 50 g,浙贝母 15 g,水煎,日服 1 剂。11 月 4 日 3 诊,诸症日见减轻,守上方加附片 8 g,续服 4 剂而安。

3 深部脓疡

徐某,男,16 岁,学生。因劳动汗出洗冷水浴后致左髌关节不适,后渐疼痛,经西药治疗未效,疼痛呈进行性加重,渐致跛行半个月余。诊时寒热往来,午后热退,左臀漫肿无头,肤色不红,无灼热,触摸则痛甚,四肢末汗出,下肢末端凉,舌苔薄白、舌质淡嫩,右脉洪大、左脉沉细。证属寒湿型贴骨疽。治以温补和阳,散寒通滞,拟阳和汤加味:熟地 10 g,白芥子 12 g,麻黄 6 g,鹿角胶 8 g,炮姜炭 4 g,明附片 8 g,生黄芪 50 g,制乳香、没药各 4 g,肉桂 4 g,水煎,日服 1 剂,嘱忌食阴冷食物,服药半个月后,热退痛减肿消,食纳差,舌苔根部黄厚腻,舌中前部无苔,脉沉迟,方用熟地 10 g,麻黄 6 g,鹿角胶 8 g,炮姜 4 g,附片 8 g,生黄芪 75 g,制乳香、没药各 4 g,肉桂 1.5 g,北细辛 4 g,浙贝母 15 g,水煎,日服 1 剂,10 天后疼痛基本消失,守上方加牛膝 15 g,甲珠 4 g,甘草 3 g,续服 3 剂,以资巩固。

4 股骨干胀病

余某,男,67 岁,退休教师。2002 年 7 月 7 日初诊,不明原因右股骨干酸胀月余,呈缓慢进行性加重,病势绵绵不休,病处难定,喜温怕寒,恶风,抚摸拍打则舒,遇寒冷则病增,舌体胖大,舌苔薄润多津,舌底静脉细长,脉沉细,拟诊为阴凝症(骨髓炎早期),治以散寒通滞,通痹止痛,药用熟地黄 12 g,麻黄 6 g,白芥子 10 g,肉桂 3 g,炮姜 3 g,鹿角胶 6 g,黄芪 30 g,牛膝 15 g,天门冬 10 g,红花 5 g,山萸肉 8 g,甘草 3 g,4 剂。7 月 11 日复诊,大腿疼痛减轻,但小腿与踝关节灼热,舌底静脉粗大。原方加丹参 15 g,黄芪加至 50 g,续服药 4 剂。7 月 15 日三诊,小腿远端及踝关节由灼热转变为风吹样凉感,守原方对症加减,续服药 8 剂而安。

按:阳和汤的使用方证主要特征为漫肿、酸痛、色白、喜温、恶寒,发病缓慢,脉沉细或迟细,随证加用附片、生黄芪、浙贝母、乳没等药则疗效更加满意。

(收稿日期:2006-03-27)