

影响肌肉收缩。穿针避开神经和血管,无一例术中穿针损伤神经和血管。而且固定牢靠,对骨折端有稳定的加压作用,促进了骨折愈合。上下关节在骨折固定的同时可以充分活动,更好地体现了骨折治疗中“动静结合”的原则。对存在内固定器材的骨不连或合并炎症、窦道者,行内固定物取出术的同时采用外固定架固定术,更是突出其优越性的一面。骨折愈合后,拔针简单方便不需住院,费用低,病人痛苦少。

骨折患者应运用中药。实践已经证明,骨折只有通过一定的固定时间,就能自行愈合,无需药物治疗的观念是错误的,无论什么样的坚强固定,也是为骨折愈合创造条件,并不能代替骨折愈合。按中医三期辨证分别用药,能使患肢早期消炎退肿时间加快,后期并能使骨痂生成加快,骨折愈合时间缩短^[3]。此类骨不连患者经切开复位,外固定架固定后宜

按骨折三期的中、后期用药处理,治疗时既要接骨续筋,还应注重养气血、补肝肾。筋骨离不开气血的温煦濡养,而筋骨又是肝肾的外合,肝肾精气盛衰,关系筋骨的强弱。方中党参、黄芪、当归、熟地、白芍益气养血,充养筋骨;杜仲、续断、骨碎补、补骨脂补益肝肾,接骨续筋;五加皮、桂枝、土鳖虫舒筋活络。共奏补气血、益肝肾、续筋骨之效。

参考文献

- [1] 陆裕朴,胥少汀,葛宝丰,等.实用骨科学[M].北京:人民军医出版社,1993.63~66,68
- [2] 裘法祖.外科学[M].第3版,北京:人民卫生出版社,1992.702
- [3] 林子顺,王和鸣.林如高正骨经验荟萃[M].北京:人民卫生出版社,1990.380

(收稿日期:2006-03-23)

中青草药治疗眼镜蛇咬伤 15 例

★ 黄金友 (福建省莆田市涵江区庄边卫生院 莆田 351127)

关键词:眼镜蛇;蛇伤;中医药疗法

中图分类号:R 278 文献标识码:B

毒蛇咬伤是农村常见的危重急性疾病,病情急、死亡率高,常因抢救不及时而危及生命,我院采用中青草药综合治疗眼镜蛇咬伤 15 例,现报道如下:

1 临床资料

15 例患者中男 7 例,女 8 例,年龄 22~57 岁,其中轻、中、重各 5 例。

2 治疗方法 **2.1 局部处理** 绑扎:在伤口近端用带扎紧,10~20 分钟松扎一次,每次 1~3 分钟。清洗:用双氧水或冷开水局部清洗。扩创:用手术刀或三棱针在伤口上一字形或十字形切开,长为 1 cm,深 3 mm,并清除蛇牙。针刺:在蛇咬伤周围用三棱针针刺,并在“八风”、“八邪”针刺放毒,可结合拔火罐吸毒。血泡处理:用针管抽出水泡中的液体,并清洗保持清洁。中青草药局部浸泡:用一枝黄花 30 g,毛大丁 30 g,七叶一枝花 15 g,观音竹 30 g,狭叶韩信草 30 g、液生腹水草 30 g,煎后局部周围浸泡,如没有办法浸泡的可用毛巾湿敷,温度适中不能太热,每次 30 分钟,每日 3~5 次,泡后可用七叶一枝花磨成糊状局部外敷。

2.2 全身治疗 用蛇伤十味散加减:半边莲 30 g,白花蛇舌草 20 g,半边旗 20 g,蜈蚣 20 g,星宿菜 20 g,一枝黄花 30 g,七叶一枝花 5 g,地耳草 30 g,观音竹 20 g,黄芩 30 g。水煎服或加小量米酒 20~

40 mL。如休克加细辛 3 g、白芷 9 g、石胡荽 9 g,血泡或出血加紫花地丁 15 g、夏枯草 30 g、狭叶韩信草 30 g,胸闷加盐肤木 15 g,咽喉阻塞感加万毒虎 30 g。

3 治疗结果

本组 15 例全部治愈,轻、中、重各 5 例,其中重度病人平均 15 天痊愈,中度病人平均 12 天痊愈,轻症病人平均 10 天痊愈。随访 3 个月无后遗症、并发症。

4 讨论

眼镜蛇是眼镜蛇科、属,卵生动物,食性广泛,性凶猛,可喷毒气致人中毒,咬后毒性更强,局部可出现 2 个牙痕,牙距 11~19 mm,伤口出血量不多,很快闭合变黑,出现血泡水泡疼痛剧烈。眼镜蛇主要有神经毒和循环毒。神经毒主要是选择性作用于运动神经骨骼肌的传导功能,使骨骼肌产生弛缓性麻痹;循环毒引起心室搏改变,心室纤维颤动,停搏危及生命。眼镜蛇咬伤后治疗原则是阻止或减慢毒素吸收、加速毒素排泄、中和毒素。我们采取绑扎、清洗局部、扩创伤口,针刺局部及“八风”、“八邪”,拔火罐伤口吸毒及中青草药局部浸泡,口服等综合性治疗,取得较满意的治疗效果。

(收稿日期:2006-04-17)