

袁惠霞散结消癥胶囊妇科应用举要

★ 王宁宁 (陕西中医学院 2002 级中西本科 2 班 咸阳 712046)
★ 梁嘉樑 (陕西中医学院 2002 级中西本科 1 班 咸阳 712046)

关键词: 散结消癥胶囊; 妇科; 袁惠霞

中图分类号: R 249.8 **文献标识码:** B

袁惠霞教授为陕西中医学院妇科专家, 从事临床和教学工作 30 余年, 她治学严谨, 经验丰富, 对妇科疑难杂症的治疗有独特见解, 尤其用散结消癥胶囊治疗一些疾病疗效颇为显著。笔者有幸随师学习, 受益匪浅, 现择几例典型案例介绍如下:

1 散结消癥胶囊的组成及功效

丹参 15 g, 路路通 10 g, 虫草 6 g, 泽兰 10 g, 荆三棱 12 g, 海藻 20 g, 红藤 25 g, 赤芍 6 g, 白芍 6 g, 半枝莲 25 g, 刘寄奴 30 g, 桂枝 10 g, 桃仁 15 g, 炒黑丑 6 g, 枳实 10 g, 全当归 15 g。此方可活血散结止痛, 软坚利水消癥。

2 典型医案

2.1 卵巢囊肿 胡某某, 女, 27 岁, 十部, 2005 年 6 月 8 日因小腹抽痛, 伴带下量多半年余就诊。患者既往体健, 月经正常, 带下不多。曾于 2003 年 2 月因卵巢囊肿蒂扭转行囊肿切除术。术后恢复尚可, 近半年来无任何原因时常有小腹抽痛, 伴带下量多, 即要求检查。妇科检查: 子宫大小、右侧附件均正常, 于左侧附件可触及一包块。B 超报告示: 左侧附件可见一大小约 5.3 cm × 5.0 cm × 4.0 cm 的暗性囊区, 壁薄, 暗区清晰。中医辨证属气滞血瘀, 水湿停聚。治以活血化瘀, 软坚散结, 利水消癥。服用散结消癥胶囊 3 个月, 2005 年 9 月 9 日 B 超复查示: 子宫附件未见异常。

2.2 输卵管阻塞性不孕 李某某, 女, 25 岁, 农民, 2004 年 11 月 6 日因婚后 5 年不孕来就诊。患者既往身体较弱, 因身体不适而多次住院治疗, 曾患为结核性胸膜炎。平素月经基本正常, 带下量多, 时黄或有腥臭味, 末次月经 11 月 5 日, 现经净 4 天。妇科检查: 阴道、子宫未见异常, 附件压缩增厚。输卵管碘油造影双侧输卵管不通, 伴右侧输卵管积水, 双侧伞端粘连。中医辨证属瘀血内阻, 水湿停聚。治以活血化瘀, 利水消肿。服用散结消癥胶囊 3 个月, 配合中药灌肠, 小腹热敷, 于 2005 年 8 月受孕。

2.3 宫外孕包块 霍某某, 女, 37 岁, 工人, 2005 年 9 月 6 日因宫外孕包块要求中药治疗。患者既往体差, 月经基本正常。2 个月前因停经自测尿 HCG(+) , 于私人诊所行人工流产手术, 术后阴道淋漓出血不止, 伴腹痛, 下坠。后于某医院作 B 超示: 子宫偏左, 后方可见 6cm × 7cm × 4cm 大小的包块。中医辨证属瘀血内阻。治以活血化瘀, 软坚散结。患者

不愿服汤剂, 即内服散结消癥胶囊, 并严密观察病情变化。病人半月后复诊加用中药保留灌肠, 服药 10 天左右, 阴道出血停止, 腹痛明显减轻, 2005 年 9 月 27 日 B 超复查: 子宫附件无异常。

2.4 子宫内膜异位症包块 叶某某, 女, 26 岁, 干部, 2004 年 6 月 17 日因右侧卵巢巧克力囊肿要求中药治疗。患者既往身体一般, 月经正常, 有较严重痛经史。2003 年 12 月于二纺医院诊为右侧卵巢巧克力囊肿行切除术。术后半年, B 超复查示: 右侧附件见 4 cm × 5 cm × 3 cm 大小的囊肿。中医辨证属瘀血阻滞。治以活血祛瘀, 散结止痛。服用散结消癥胶囊 1 个月, 经行腹痛明显减轻, 连服 3 个月后 B 超复查示: 子宫附件无异常。于 2005 年 5 月受孕。现孕 5 个月, 胎儿发育正常。

3 体会

以上 4 种疾病, 都属于中医学“癥瘕”的范畴。虽然发病时的症状各异, 但是在疾病的发生发展过程中都出现了气滞血瘀, 瘀血内阻胞宫胞络的相同病机。《妇人良方》校注补遗云: “夫妇人腹中瘀血者, 由月经否涩不通, 或产后余秽未尽, 因而乘风取凉, 为风冷所乘, 血得冷则成瘀血也。瘀血在内则时时体热面黄, 瘀久不消则变成积聚癥瘕矣。”^[1] 治疗如《血证论》所说: “故凡血证总以去瘀为要。”^[2] 因此在治疗这种类型疾病的过程中, 主要运用祛瘀活血的中药进行配伍, 同时可以根据临床证候, 辅以行气补虚、软坚散结、祛湿消肿的中药。因此针对其病因病机相同, 采用异病同治的方法。拟定的散结消癥胶囊, 集活血化瘀、软坚散结、消肿止痛等功效于一体。方中赤芍、桃仁、荆三棱、穿山甲、丹参、泽兰活血化瘀; 虫草、刘寄奴破血散结, 以促进肿块的消散和吸收; 红藤、半枝莲、炒黑丑清热利湿消肿; 海藻、穿山甲、路路通、枳实散结化瘀, 利水消肿; 桂枝辛散通温、活血通经; 白芍、全当归养血活血, 调经止痛, 辅助人体正气。方证切合故临床效果显著。

参考文献

[1] 宋·陈自明. 妇人大全良方 [M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1991.238

[2] 清·唐宗海. 血证论 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 1990.68

(收稿日期: 2006-01-06)