

宫颈炎康栓合素平浓缩液治疗宫颈糜烂 82 例

★ 肖明翠 杨秀芬 (山东省聊城市妇幼保健站 聊城 252000)

摘要:目的:探讨宫颈炎康栓合素平浓缩液联合治疗宫颈糜烂疗效。方法:82 例宫颈糜烂患者,在月经干净第 2~3 天或宫颈糜烂波姆光治疗后出血者即开始进行治疗,采用素平浓缩液宫颈上药,同时配合宫颈炎康栓阴道放置。结果:总有效率为 95.1%。结论:宫颈炎康栓合素平浓缩液治疗宫颈糜烂疗效显著,安全可靠,无创伤,尤其适用于未生育妇女,是一种治疗宫颈糜烂较理想的方法。

关键词:宫颈糜烂;宫颈炎康栓;素平浓缩液

中图分类号:R 289.5 **文献标识码:**B

2003 年以来,笔者在妇科门诊应用宫颈炎康栓合素平浓缩液联合治疗宫颈糜烂 82 例,收到满意疗效,现报道如下。

1 临床资料

年龄 22~49 岁,平均 29.5 岁;宫颈糜烂轻度单纯型 60 例,中度颗粒型 12 例,重度乳突型 10 例;症状为阴道分泌物增多,脓性或白带中夹有血丝,或有接触性出血,腰骶酸痛,小腹坠胀等;妇科检查时可见宫颈有不同程度糜烂、肥大,有时质硬。选择病例:宫颈 I~Ⅲ°各种类型的糜烂(经癌前筛查后)、宫颈糜烂波姆光治疗后出血或 2 个月后复查恢复不良者。

2 治疗方法

2.1 治疗时间 月经干净后 2~3 天或宫颈糜烂波姆光治疗后出血者即开始治疗,采用素平浓缩液宫颈上药,同时配合宫颈炎康栓阴道放置,治疗前进行宫颈刮片、固有荧光阴道镜等防癌普查,必要时宫颈活检,以排除宫颈癌。

2.2 用药方法 上药时患者取膀胱截石位,阴道窥器暴露宫颈,用 0.2% 碘伏消毒阴道和宫颈,如有节育环尾丝,一并消毒后,用干消毒棉球将宫颈表面分泌物擦拭干净;将浸有素平浓缩液的棉签插入宫颈管,转动数次取出,然后再用等大或稍大于糜烂面的棉球(或纱布块)浸以素平浓缩液,轻轻敷贴压迫于病变组织,持续 3~4 分钟,使病变部位变为白色即可,重度者可重复一次;如糜烂面较大或大面积出血时,可按顺时针方向逐步分区上药,要均匀,避免遗漏;上药中如发生出血情况,应先剥取血痂压迫 2~3 分钟。隔日晚上睡觉前阴道深部贴近宫颈部位置入宫颈炎康栓 1 枚,3 日后再到医院上素平浓缩液一次。药栓和药液交替使用。用药期间禁止性交、盆浴、阴道灌洗及游泳,经期停用,配合使用卫生护垫,防止污染衣物和被褥,2 周为一疗程。重度宫颈糜烂治疗 1 个疗程后,如效果不理想可进行第 2 个疗程。直至痊愈。

3 治疗结果

治愈(宫颈光滑,糜烂面消失)60 例,显效(糜烂面缩小超过 50%,或Ⅱ°转为Ⅰ°、Ⅲ°转为Ⅱ°,或糜烂程度由深变

浅)11 例,有效(糜烂面积缩小但不超过 50%,糜烂程度由深变浅不显著)7 例,无效(糜烂面积无变化或有发展)4 例,总有效率为 95.1%。

4 讨论

宫颈炎康栓系纯中药制剂(广西康华药业有限责任公司生产),成分为苦参、枯矾、苦杏仁、冰片,具清热燥湿、祛腐生肌、杀虫止痒、抗菌消炎之功效。具有 5 大技术特点:(1)靶向技术。选择性地吸附在糜烂面上,不伤好皮;(2)自动成膜技术。融化后即形成药膜覆盖在糜烂面上,因而不外溢,并能通过凝固糜烂面的蛋白质封闭腺管口,从源头上阻止大量的粘液分泌,改善白带过多状况;(3)缓释技术。药膜在 48 小时内持续释放药力,解决了有效给药的难题;(4)精制浓缩技术。每颗栓粒仅 1.2 g,只是同类产品的 1/2~1/3;(5)祛腐生肌与脱落技术。药物能凝固糜烂面的坏死组织,使其结痂、枯死,然后与药膜一起脱落,促进正常组织的恢复。总结三大优势:只治糜烂,不伤好皮;形成药膜,持续药力,隔天一粒,简单便宜。

素平通用名聚甲酚磺醛(烟台荣昌制药有限公司生产,英文名 Poliresulen Suppositories)。每克素平浓缩液含聚甲酚磺醛 300 mg,适用于阴道与宫颈的各种炎症(如细菌、滴虫和真菌引起的白带增多)、宫颈糜烂、尖锐湿疣和使用子宫托造成的压迫溃疡、宫颈息肉切除活切片检查后的止血等。聚甲酚磺醛是一种高酸物质,它对坏死病变组织具有选择性的凝固作用,能够使病变组织蛋白变性凝结而易于排除,但正常鳞状上皮则不受影响。它还具有收敛止血和促进创面愈合的功效。使用后在较短时间内病变组织产生一系列良性反应,破坏表面的柱状上皮细胞,促进新的鳞状上皮细胞生成,修复创面,从而达到治愈目的。

参考文献

[1] 乐杰. 妇产科学[M]. 第 5 版,北京:人民卫生出版社,2002. 291~294

(收稿日期:2006-12-04)