

百多帮软膏合复方新诺明粉治疗 II 期以上褥疮 23 例

★ 汪华萍 (江西省肿瘤医院 南昌 330029)

关键词:百多帮;复方新诺明;褥疮

中图分类号:R 639 文献标识码:B

褥疮是长时间卧位患者常见的并发症。尤其是肿瘤晚期患者,如果处理不当,不仅增加病人的痛苦,降低生存质量,甚至因感染导致败血病而危及病人的生命。我科自 2001 年 2 月以来,采用百多帮软膏合复方新诺明粉末治疗 II 期以上褥疮,收到良好效果。现报道如下:

1 临床资料

本组 23 例均为我科带褥疮入院病人,男 16 例,女 7 例;年龄 33 ~ 72 岁,平均 56.3 岁。其中 22 例为癌症晚期全身广泛转移的患者,1 例脑血管意外患者。按《基础学护理》褥疮评定标准确定其面积、程度。治疗前褥疮面积为 2.2 ~ 18 cm × 1.9 ~ 9.7 cm;II 期褥疮 9 处,III 期 17 处,IV 期 5 处。

2 治疗方法

取复方新诺明片研成细末备用。治疗前常规清洁消毒褥疮周围皮肤,生理盐水清洗创面,再把百多帮软膏均匀地涂在创面上及创面周围的皮肤上,然

后洒上一层复方新诺明药粉,药粉不宜太薄,以能全部覆盖药膏为宜。治疗早期创面需用消毒敷料覆盖并固定,待创口变干燥后,可将创面暴露。创口换药每日 1 次。

3 治疗结果

治愈(创面愈合,结痂并脱落)27 处;显效(无分泌物,创面缩小,有肉芽组织生长)2 处;好转(渗出减少,创面无扩大)2 处,治愈率为 87.1%,总有效率为 100%。其中 II 期和 III 期褥疮 24 处愈合时间(8.6 ± 2.4)天,IV 期褥疮 3 处愈合时间(19.0 ± 6.0)天。

4 讨论

百多帮软膏合复方新诺明药粉具有杀菌、滋润、收敛等作用,治疗中、重度褥疮效果良好,治愈率为 87.1%,本方法使用过程中未发现过敏反应及其他副作用,宜于临床推广应用。

(收稿日期:2007-12-19)

等正虚邪实之病候,当立攻补兼施之法,旨在恢复肾脏“藏精泌浊”职能。是方宗大黄附子汤,取大黄附子温泻通便,导浊阴于后;采泽泻饮加黑大豆,“洁净腑”利浊阴于前;师橘皮竹茹汤,降逆和胃,俾患者可受纳诸药,以达病所;重用黄芪合附子自可温补脾肾,消散阴翳;尤取大黄制用,可兼通利血脉,推陈致新之功。业师审此案批语:读仲景书,贵在扩大其辨证施治范围,用仲景方,贵在古方今用。业师明训,志之不忘。

4 芍药甘草汤加味治妊娠合并胆蛔症

李某,女,27 岁,1981 年 1 月 21 日诊。素有寄生虫病,今怀孕 6 月,苦于右上腹绞痛阵作,辗转不休。中医辨证:蛔扰中清之腑,气机不通则痛,急当

安蛔止痛,谨防胎元受戕。方用芍药甘草汤加味 2 帖:白芍 15 g,甘草 12 g,茵陈 15 g,乌梅 10 g,川椒 3 g,苦楝根皮 15 g。随访患者,1 剂痛减,2 剂痛瘳。

按:芍药甘草汤原系仲景为太阳病误汗伤阴致“脚挛急”所设,历代医家则扩大了本方应用,特别是明代徐春圃用本方治小儿热腹痛与痉症腹痛及清代程钟龄言本方“止腹痛如神”,给后人启迪很大。本案妊娠合并胆蛔治疗,以经方芍药甘草汤加味投之,既无伤胎之虞,又收“一剂知、二剂已”之效。诚如业师点评:举凡应用经方,惟辨证明,选方准,增损宜,实有事半功倍之力。

(收稿日期:2007-09-11)