

复方当归注射液局部注射治疗褥疮 33 例

★ 饶晓明 李清萍 罗昭娜 (江西中医学院附属医院 南昌 330006)

关键词:复方当归注射液;局部注射;褥疮

中图分类号:R 632.9 文献标识码:B

1 临床资料

选择褥疮一期、二期无皮肤感染、溃疡者进行治疗。治疗组 33 例,男 19 例,女 14 例,年龄 45~76 岁,病程 3 个月~2 年,原发病为脑瘀血 13 例、股骨骨折 9 例、肿瘤 11 例;对照组 30 例,男 18 例,女 12 例,年龄 50~78 岁,病程 1~3 年,原发病为脑瘀血 15 例、股骨骨折 10 例、肿瘤 5 例。两组年龄、性别、病程及病种均具可比性。

2 治疗方法

治疗组用中药复方当归注射液 2~4 ml,隔日 1 次,在褥疮周围局部采用皮下注射,10 天为一个疗程,一般治疗 2 个疗程;对照组用 50% 红花酒精局部按摩治疗。

3 治疗结果

治疗组显效(局部皮肤红肿、瘀血、疼痛消失)11 例,有效(局部皮肤红肿、瘀血、疼痛减轻)18 例,无效(局部皮肤红肿、瘀血、疼痛无改善)4 例,总有效率为 87.8%;对照组分别为 5、15、10 例,65.15%。两组比较, $P < 0.05$ 。

4 讨论

本试验中所用的复方当归注射液主要成分有当归、降香等。当归为血家圣药,具有补气活血止痛,润燥滑肠的功能。当归注射液局部注射后,使气血得以通调,气畅血行,则瘀结得去,积聚得消,团块得化。现代药理学研究发现,当归不仅能有效扩张外周血管,降低血管张力,加速血流量,而且可显著降低血浆粘度,明显抑制血小板聚集,有良好的活血化

瘀功能。当归对中枢神经系统有明显的抑制作用,其镇痛镇静效果是乙酰水杨酸的 1.7 倍,而且当归对各种致炎剂引起的急、慢性炎症肿胀均有明显的抑制作用,可有效降低毛细血管通透性,抑制 PGE_2 的合成与释放,显著降低炎性组织中的 PGE_2 含量,降低补体旁路的溶血活性,并有显著的免疫增强、损伤抑制、抑菌和促创伤愈合的作用。有明显的“通经活血、消肿定痛的”作用^[1]。降香功能为行气止痛,活血止血。现代药理研究表明,其能抑制血栓形成;降香的乙醇提取物 50 mg/kg 灌胃,有明显的镇痛作用,^[2]并且使用注射直接作用于病灶,药物吸收效果较好,直接改善微循环作用,本研究中复方当归注射液临床应用总有效率明显优于对照组($P < 0.05$)。

复方当归注射液局部注射,是运用中药当归具有活血化瘀之功效,通过现代注射手法,解决局部皮肤组织“瘀、结、痛”的症状。实践结果亦揭示,通过药物的局部渗透和吸收,扩张血管,促进局部的血液循环,通过血脉、经络,使药力直达病所,达到了调整机体的目的。本治疗方法简便、安全,易于操作,经济实用,无任何副作用,提高了病人的生活质量,有广阔的市场前景。

参考文献

- [1] 秦可枫. 对当归命名含义及其药理学特点的认识[J]. 中医正骨, 1999, 11: 19.
- [2] 瞿慧. 中药降香研究进展[J]. 辽宁中医学院学报, 2003, 2: 2.

(收稿日期:2008-09-02)

欢 迎 投 稿 ! 欢 迎 订 阅 !