疏肝和胃法治疗反流性食管炎 30 例

★ 刘亦文 (江西省健康教育所 南昌 330046)

关键词:反流性食管炎;肝胃不和;疏肝和胃法

中图分类号:R 571 文献标识码:B

反流性食管炎(reflux esophagitis, RE)是指由于胃和(或)十二指肠内容物反流至食管引起食管粘膜组织损害。主要症状为烧心、反酸及胸痛等。抑酸治疗在防治 RE 中的作用已得到肯定,但存在易复发、不良反应多、费用高等缺点。我们采用疏肝和胃法治疗反流性食管炎肝胃不和证,取得了满意的疗效,将研究结果报道如下:

1 临床资料

所选 60 病例来自 2008 年江西中医学院附属医院门诊和住院病例,均有明显的烧心、反酸、胸骨后灼痛、咽部异物感、吞咽痛等症状,经电子胃镜诊断为反流性食管炎。胃镜检查分级:0 级,正常(可有组织学改变),计 0 分;I 级,食管粘膜点状或条状充血,计 1 分;II 级,有条状充血,糜烂,并有融合,但非全周性,计 2 分;III 级,病变广泛,充血,糜烂融合全周性成溃疡,计 3 分。随机分为治疗组和对照组各 30 例。其中治疗组男 20 例,女 10 例;年龄 18 岁~65 岁,平均(35.7±11.5)岁;病程 30 天~8 年。对照组男 18 例,女 12 例;年龄 18~68 岁,平均(36.2±13.4)岁;病程 21 天~10 年。两组患者性别、年龄、病程、致病因素及治疗前胃镜合并症分布情况,经检验, $P>0.05$,无显著性差异,具有可比性。

2 治疗方法

治疗组服用疏肝和胃汤,主要药物为:柴胡、炒枳实、炒白芍、炙甘草、玄胡、川楝子、蒲公英、浙贝母、白及、黄连、田七粉等。每日 1 剂,水煎 2 次得药汁 200 ml。每次服 100 ml,每日 2 次。对照组选用奥美拉唑(由阿斯特拉(无锡)制药有限公司生产)。每日 20 mg,晨起空腹口服。两组均 4 周为一个疗程,共观察 2 个疗程。服药期间停用影响本病药物评价的其它药物。

3 治疗结果

3.1 疗效标准

3.1.1 症状疗效评定标准 所有症状都分为无、轻、中、重四级(参照李乾构等主编《中医消化病诊疗指南》附录中肝胃不和证的症状分级量化表)在主症分别记 0、2、4、6 分,在次症则分别记 0、1、2、3 分。

3.1.2 胃镜疗效评定标准 依据全国反流性食管病/反流性食管炎研讨会 1999 年 8 月在山东省烟台市通过的内镜疗效分级诊断标准:痊愈:内镜积分 0 分者;显效:内镜积分减少 2 分者;有效:内镜积分减少 1 分者;无效:内镜积分无变化或增加 1 分以上者。

3.1.3 临床综合疗效评定标准 痊愈:症状基本消失或治疗后症状积分值较治疗前减少 $\geq 95\%$,内镜积分 0 分者;显效:治疗后症状积分值较治疗前减少在 70%~95%之间,内镜积分减少 2 分者;有效:治疗后症状积分值较治疗前减少在 30%~70%之间,内镜积分减少 1 分者;无效:治疗后症状积分值较治疗前减少 $\leq 30\%$,内镜积分无变化或增加 1 分以上者。

3.1.4 复发研究 12 周后症状积分值较治疗前者减少 $\geq 95\%$ (痊愈标准)或积分值较治疗前减少在 70%~95%之间(显效标准)者,评定为未复发;12 周后症状积分值较治疗前减少在 30%~70%之间(有效标准)者,评定为复发。

3.2 治疗结果

见表 1、2、3、4。

表 1 两组临床症状积分比较

症状	治疗组		对照组	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
烧心	2.576±1.627	0.451±1.145	2.743±1.368	1.286±1.501
反酸	2.916±1.427	0.517±1.207	3.168±1.286	1.383±1.412
胸骨后痛	1.523±1.403	0.317±0.628	1.614±1.374	0.605±1.074
胃脘胀满	1.708±0.571	0.273±0.564	1.816±0.553	0.481±0.612
喜太息	1.623±0.602	0.354±0.591	1.572±0.714	0.612±0.723
暖气	0.549±0.612	0.215±0.317	0.617±0.704	0.217±0.367

注:经 t 检验,两组临床症状积分与治疗前自身比较有较显著性差异($P<0.01$);治疗后组间比较无显著性差异($P>0.05$)。

自拟固肾健脾方治疗糖尿病Ⅲ期肾病 28 例

★ 张丹芳 程时杰 (浙江省象山县中医院 象山 315700)

摘要:目的:观察自拟固肾健脾方治疗糖尿病Ⅲ期肾病的临床效果。方法:将临床确诊为糖尿病且合并早期肾功能损害(糖尿病Ⅲ期肾病)的患者 46 例随机分成对照组(18 例)和治疗组(28 例)。两组均常规口服格列喹酮(糖适平)。治疗组加服固肾健脾方汤,4 周为一个疗程。比较 24 小时尿微量白蛋白及临床常见症候的变化。结果:治疗组与对照组均能降低 24 小时尿微量白蛋白($P < 0.01$),但二者之间无显著性差异($P > 0.05$);治疗组临床症状的改善与对照组相比有显著性差异($P < 0.05$)。结论:固肾健脾方不仅可以降低早期糖尿病肾病患者尿微量白蛋白,改善已受损害的肾功能,延缓肾功能衰竭的自然进程,还能显著改善糖尿病肾病患者临床症状,提高糖尿病肾病患者生存质量。

关键词:固肾健脾方;糖尿病肾病;糖适平

中图分类号:R 587.1 **文献标识码:**B

我们根据糖尿病早期肾病患者脾肾两亏的病因病机,采用自拟固肾健脾方治疗糖尿病Ⅲ期肾病 28 例,取得了较好的疗效。现报告如下。

1 临床资料

1.1 纳入对象 纳入的研究对象为我院 2008 年 4 月~2008 年 11 月期间在我科住院的糖尿病Ⅲ期肾病患者 46 例,所有病例均符合中华糖尿病学会 1999 年正式采用的《糖尿病诊断和分型标准》^[1];所

有患者均排除严重的心、肺、脑合并症,且无发热、无酮症酸中毒,均有糖尿病Ⅲ期肾病,连续 2 次尿微量白蛋白尿检测在 30~300 mg/24 小时之间(尿蛋白排泄率在 20~200 $\mu\text{g}/\text{分钟}$)。46 例病人随机分为两组:对照组 18 例,患病时间 2.2 个月~6.8 年;治疗组 28 例,患病时间 2.8 个月~7.1 年。两组患者在年龄、性别、病程、相关实验室检测指标、临床表现等方面比较,差异均无统计学差异($P > 0.05$),具

表 2 胃镜分级疗效比较

组别	总例数	痊愈	显效	有效	无效	总有效率
治疗组	30	17	6	4	3	90%
对照组	30	15	7	3	5	83.33%

注:经 Ridit 分析,组间治疗前后比较,均无显著性差异($P > 0.05$);组内胃镜疗效比较均有极显著性差异(P 值均 < 0.01)。

表 3 临床综合疗效比较 例(%)

组别	总例数	痊愈	显效	有效	无效	总有效率
治疗组	30	18	5	3	4	86.67%
对照组	30	16	3	5	6	80%

注:经 Ridit 分析($P > 0.05$)无显著性差异。

表 4 停药 12 周后两组复发率比较 例

组别	随访例数	复发例数	复发率(%)
治疗组	19	2	10.53%
对照组	16	9	56.25%

注:经 χ^2 检验,有显著性差异($P < 0.05$)。

4 讨论

本病病位在食管,属胃所主。胃失和降,胃气上逆是其基本病机;情志不畅,肝气犯胃是其发病的关键;气机郁滞,郁久化热,是其转变特点;痰阻血瘀,是其最终结局。因此在辨治反流性食管炎时,先审

脏腑,再分虚实、辨寒热,但不管何脏何腑,或虚或实,或寒或热,最终却要责之于肝,通过疏肝理气达到和胃降逆,治疗病痛之目的。疏肝和胃汤由经典名方“四逆散”和“金铃子散”加减化裁而成。四逆散出自《伤寒论》,原为少阴四逆证而设,本方以苦、甘、辛为主,具有宣达郁滞之功。方中柴胡宣阳解郁使阳气外达,枳实破滞气,白芍和血,甘草缓中调胃以解郁热。柴胡、甘草同用,和中疏肝;枳实、白芍同用,通经散结。现代研究表明四逆散能够调节胃肠运动,促进胃蠕动和排空。金铃子散行气止痛,缓解平滑肌痉挛。其作用机制可能是通过促进食管体部的蠕动,增加下食管括约肌压力,增强胃肠动力,从而加强抗反流机制;也可能是通过促进胆汁排泄,抑制胃酸分泌、胃蛋白酶活性,从而有效减少胃食管反流尤其是十二指肠胃食管反流,促进食管黏膜破溃愈合。这可能与疏肝和胃中药多层次、多靶点的作用特点有关,但其确切的起效机制仍需进一步研究。

(收稿日期:2009-05-04 责任编辑:查青林)