

江西血吸虫病流行史初探

★ 肖建文¹ 杨婉琪² 肖建春³ (1. 江西财经大学信息管理学院 南昌 330013; 2. 江西财经大学工商管理学院 南昌 330013; 3. 井冈山大学附属中学 吉安 343000)

摘要:血吸虫病是对民众危害最为严重的地方性疾病之一,然史学界对其却关注不足,尤其对血吸虫病流行史模糊不清,这也制约了血吸虫病研究的深入。选择血吸虫病流行最为严重的省份之一江西,参阅县志、中医古籍、医学杂志;查阅族谱、古墓碑文;收集民间传说、乡土歌谣等资料,采用医疗社会史、口述史等研究方法对江西血吸虫病的流行史作了梳理。

关键词:江西;血吸虫病;流行史

中图分类号:R-092 **文献标识码:**A

近年来医疗社会史研究日益深入,遗憾的是,史学界对于血吸虫病的研究却关注不足。对大多数人来说,因毛泽东诗句《送瘟神》而闻名的血吸虫病或许仅停留在对一个年代的追忆当中,但是对常年生活在南方一些江河湖畔的居民来说,血吸虫病可能就是刻骨铭心的磨难。江西是血吸虫病流行最为严重的省份之一,笔者立足江西,对历史时期江西的血吸虫病做一梳理,探析其流行史,期冀能对血吸虫病的深入研究起一抛砖引玉之效。

研究历史时期江西的血吸虫病,碰到的难题之一就是如何断定资料所载的疫病是否为血吸虫病。一方面,在研究治疗血吸虫病的专书出现之前,血吸虫病无统一学名,记载多不一致;另一方面,普通民众和医者对此病亦多茫然无知,对其记载亦是误以为他病或邪妄。一些地方,受其害者百有余年,时医无从下手,或据外表症候,当腹鼓病医治;或指为天灾人祸,求神以驱之。这使得我们今天利用文献从史学或社会学角度来研究血吸虫病就会产生分歧,难以再现历史真实和接近科学的原生形态。尽管如此,最大可能理清血吸虫病的源流仍是我们研究血吸虫病的前提所在,这对于深入研究血吸虫病不同时期的流行分布、特点、因素、后果以及普通民众、各级政府对其的认识与应对防治等极为必要。

我国流行血吸虫病的滥觞,可从考古发现中找到一些线索。从 1971 年湖南长沙马王堆汉墓出土的西汉女尸和 1975 年湖北江陵县凤凰山出土的西汉男尸体,查到日本血吸虫虫卵,这一发现证实血吸虫病在我国流行历史至少已有 2 100 多年之久。江西血吸虫病流行的确切年代,迄今为止,尚无考古定论。但细细翻阅县志、中医古籍、医学杂志、族谱、古墓碑文,收集民间传说、农谚、歌谣以及新中国建国初的调查报告等资料,同时参与直接访谈血吸虫病幸存老人或目击者等形式,通过文字资料与乡土话语的综合分析,我们依稀可知道江西省各地疫区

血吸虫病距今的流行大致年限。

传统医学所指的蛊症,大抵包括导致腹部肿胀的一些疾病。众所周知,通常心、肾、肝等引起的腹水病不致造成流行且严重流行的状况,而血吸虫病会导致腹部肿胀,引起腹水病,符合传统医学蛊症的症状,且易造成严重流行。巢氏《诸病源候论》记载五蛊的病死率颇高,所谓“蛊病多趋于死,以其毒害势甚,古云蛊毒”,这与血吸虫病导致的死亡严重情况相符。从古代相关医学著作中描述的古代疾病如蛊毒、蛊痢、血蛊、蛊胀、水蛊、臌胀、石水、水注、臌注等疾病的症状来看,其症候与今天我们认识的血吸虫病有很多相似之处。巢氏《诸病源候论》中记载的五蛊症状“乍冷乍热”、“手足烦痛”、“胸痛”、“咳唾脓血”、“乱下脓血”,这些症候似合于血吸虫病急性期症候;“羸瘦、枯槁而死”则为一般血吸虫病患者晚期高度贫血衰弱所常见的症状;“腹内胀满,状如蛤蟆”似合乎于血吸虫病慢性期的痞块型。在苏颂的《本草图经》中“蛊痢下血,男妇小儿腹大,下黑血,茶脚色或脓血如淀色”似颇符合于血吸虫病痢疾型及肝脾肿大期而经常解黑如淤泥大便的情况。再者从病程来看,蛊毒病程较为缓慢,所谓的“二百日不治”、“经年不治”、“亦有得之三年乃死,急者一月或百日即死”,这和血吸虫病是一种慢性疾病相符。以上虽不足以说明蛊症就是血吸虫病,但其中混有血吸虫病的迹象或者说这些病名里包含有血吸虫病则极有可能。当然,由于血吸虫病的外部最明显症状就是肚子肿大,各疫区居民俗称的“大肚子病”“泡肚”绝大部分所指即为血吸虫病。

据建国后江西省中医实验院的研究显示,自第七、八世纪以来,血吸虫病主要流行于江南各省。《外台秘要》引崔氏“蛊吐血方”云:“凡蛊有数种,郡县有名章者尤甚,今东有句章,南有豫章,无村不有”,若材料中所言蛊包含有血吸虫病,而当时的句章在今天血吸虫病疫区浙江鄞县附近,豫章也在今

江西血吸虫病疫区南昌境内,以此为据,则江西省血吸虫病广泛流行可追溯到唐代。明末清初,江西医家喻嘉言(1585~1664)在其诊治郭台尹的血蛊案中指出:“郭年来似有老怯意,胸膈不舒,面色萎黄,胸紧肋胀,腹疼,将成血蛊之候也……男子病此者甚多,而东南沿海一带,比他处更多男子病此者甚多,而在东南沿海一带更多”。另一江西医家翁藻江在其《医钞类编》云:“蛊胀者,中实有物,腹形充大,非蛊即血也。其症腹大,按之有块,四肢瘦削,发热不退……。”此两则描述恰似符合于晚期血吸虫病的痞块型,果若其实,则证明江西省血吸虫病在明末清初便已有之。

至于江西有明确的血吸虫病字样记载则始自1909年。1905年,美籍医师罗根 O. T. Logan 在湖南省常德县周家店发现中国首例日本血吸虫病人。嗣后,遂有江西境内的病例报告。1909年,兰白悌(Lam bert)氏首次调查证实九江所见的风疹热为血吸虫病。1910年,泰勒氏(TayLoy)在九江检查66个病人,发现16人为血吸虫病(《江西卫生志》)。这与《新中国预防医学历史经验》记载的1910年江西被证明有血吸虫病病人存在相符。

江西血吸虫病的流行分布,依据建国初的重点调查与系统调查相结合,初步确定于南昌市、九江专区、宜春专区、上饶专区、吉安专区、赣州行政区等6个地区的33个县市为疫区(此依据的是1959年底江西的行政区划),且疫情分布不平衡、血吸虫病出现开始时间有先有后,因此,即使是在江西这样一个相对比较狭小的空间范围内笼统地谈论血吸虫病流行史也显得过于简单,对于江西血吸虫病研究的深入实际意义亦不大。故而下面还是先根据掌握的资料情况对江西不同疫区作具体问题具体分析,尽可能理清江西各疫区县市的流行大概年限。

在九江地区:清《德化县志》(今九江县)记载:清顺治初(1644~1650),花自达,字乔石,德化文学也。有丐者患肿胀,与饮食茵陈五苓散,饮之半晌小腹痛可忍,横出怨言,后强饮温水酒壶,溺如泉涌,肿立消。这是300余年前诊疗“水蛊病”的医案。若清《德化县志》所记载的水蛊病即为血吸虫病,则江西省血吸虫病流行在九江县大约可追溯到350年前左右了。另据中央血防办公室给九江提供的资料,1910年,李广勋最早在九江发现血吸虫病。这与九江百年大事记的记载一致:“1910年,九江府德化县首次发现血吸虫病人”另《九江文史资料》第1辑称1901年李广勋最早在九江发现血吸虫病,当属有误。据此分析其在九江县流行有近百年的历史当属可以认定的事实。

九江市血吸虫病的流行,据1958~1959年对该

市流行疫区较早的村庄茅山头一位72岁老婆婆的访问:“茅山头一直是块败人之地,(我)7岁来到这里,当时有48户300多人,是个繁荣集聚的村庄,不久有了水蛊病,人口死亡越来越多,村子衰败下来”。从访问中我们推论,假设在其十岁时开始有“水蛊病”,九江市的血吸虫病流行距今可能有110余年了。

在湖口,据该县建国初老中医沈棣初回忆,“听长辈的传说,明朝初年,在湖口舜德皂湖一带血吸虫病已猖狂流行”,但无资料考证。仅据1941年出版的《中华医学杂志》第九期记载,1924年外国学者Faust. E. C等在湖口首次发现血吸虫病人,可初步断定湖口县血吸虫病流行距今至少约85年。

新《星子县志》记载,星子县在清光绪年间“大肚子病”开始流行,但翻阅清代《星子县志》,笔者没能找到可证实之史料。然依据建国初的调查材料,当时的疫区老农反映:流行最早的五里乡交通社易胡家湾50年前住有胡、郑、易、宋、夏、陈、徐七姓400多人,因“大肚病”死人甚多,至1949年剩两姓十多人,群众说这里叫龙船地,龙船地不能住易、夏、陈三姓,易、夏、陈谐音读“一下沉”,因此这里来多少死多少。老农的反映颇含迷信成分,却也提供了这样的信息,该县血吸虫病距今约有100来年的流行史。

瑞昌县血吸虫病流行历史久远,但始于何年,无可稽考。据疫区老人的传说:“清同治年间起,高丰乡龚家湾村因大肚子病流行导致户口锐减”。

血吸虫病在彭泽县内流行年代久远,仅据民国年间的老人回忆推测,流行年限逾百年。

都昌县受血吸虫病危害始于何时,亦无从稽考。但据疫区老人的回忆,至少可追溯至清代中叶,尤以民国18~38年为甚。

永修县血吸虫病的流行年代,无文字记载,据1941年出版的《中华医学杂志》第九期记载,1924年外国学者Faust. E. C等在该县首次发现血吸虫病人。1958年在该县调查时,吴城镇一些70多岁的老人回忆:“当他们还是小孩时,曾亲眼目睹很多人患大肚病或泡肚病死亡。可见血吸虫病在该县流行至少有100多年的流行历史。新《永修县志》也记载该县的流行可上溯到100多年前。

德安县血吸虫病流行时间无确切证据可考,建国初的调查推论距今约90余年。另1924年Faust. E. C首次发现该县为血吸虫病疫区是有资料记载最早时间。

宜春专区,血吸虫病在奉新的流行,相传是在清咸丰九年(1859年)由苏北传入,此后逐渐蔓延开来。疫情严重,干洲群众中流传着“喝了黎堰水,饱

肚饱十里,十里转个湾,饱肚哩送上七里山”的悲惨歌谣。

血吸虫病在丰城的流行,该县埂头村清同治九年(1870 年)前有 1 400 多户 4 000 多人口,因血吸虫病,到清光绪七年(1881 年)只剩下 20 多户 30 多人。民国 36 年下半年,省立丰城医院接诊了一些“臌腹病”,经检验为肝硬化腹水,并于粪便中查出日本住血吸虫卵(《丰城县志》)。

上高县血吸虫病流行很久,约有百余年(《上高县志》)。

上饶专区血吸虫病的流行,据传,清乾隆年间(1736~1795),广丰县大南地区塘狮乡发现了此病。清道光十二年(1832),万年县有此病患者。清咸丰年间(1851~1861)广丰县大南乡茅厂姜家坞、余干县腾溪以及婺源县等地均先后发现此病。清末,该病在德兴、玉山等县亦相继流行。显然,若所传属实,上饶地区的血吸虫病始于清代乾隆年间。民国 13 年(1924),鄱阳县(后改名波阳)发现该病。民国二十六年(1937)德兴县畈大、中洲一带发现血吸虫病患者(《上饶地区志》)。

上饶县血吸虫病流行,据新《上饶县志》的记载已有 300 余年的历史,至清末和民国时期迅速蔓延,疫区扩大。

婺源县血吸虫病究竟什么时候开始流行,据 1953 年调查,百姓传说,自从太平军由休宁去景德镇经过此地(婺源,1855 年 2 月 26 日),大肚子病就多了起来,由此推算血吸虫病在婺源的流行至今有近 150 年左右的时间了。另据清代《婺源县志》载“在婺源岩下横亭一带,逐有蛊症发生,死亡众多,田地荒芜、十室九空……等”,又曰“此乃取石烧灰破坏龙脉,以致人畜不旺鸡犬不宁”等语,这一记载中说明当时蛊症在当地的危害严重。此外又在该县光绪十六年“续刊保龙全书”中记载“国朝康熙、乾隆年间,递被奸民伐石烧灰,闾邑受害,递经官绅封禁,人困渐苏。迩来附近刁民又复越禁开窑烧灰射利,甚且擅用硝磺轰击龙脉,山崩石裂、地震天惊。……”为此专设保龙局“以保龙脉,使人畜安宁”,此乃始于清康熙乾隆年间,后因有人逐渐越禁,才于光绪十六年重申严禁。以康熙末年即 1735 年计算,距今 274 年,此病开始年限应该早于康熙末年,因先出现大量人口死亡,然后才会采取措施。由此推断血吸虫病在婺源流行年限至今至少在 274 年以上。

余江县血吸虫病在该县流行最早于何时,史无记载。《余江县血防志》记载:“血吸虫病我县流行时间可能有三、四百年,而危害严重也有一、二百年。”从这可推算应开始于明朝。另据群众回忆,清朝,民国时期,该县白塔河两岸的马岗、西畈、蓝田畈

等地方就有大肚子病流行。据紫云乡(今邓埠乡)西畈村的《吴氏宗谱》和杨家车村(古名杨溪)于清乾隆四十五年九月(1780 年)纂修的《宗谱》对人口大量死亡的记载统计与感叹,推知该县血吸虫病可能在清乾隆以前就已流行。建国初的调查访问,有 80 岁的老人说他的父、兄、公公、婆婆都是死于大肚病。从老人的话语中,我们假设在其 20 岁时她的亲人感染或死于大肚病,这一访问暗示该县血吸虫病流行可能 110 余年。有民国 35 年《余江县政府工作报告》记载“余江县狮岩乡(今马荃镇、邓埠镇的一部分)曾发现日本血吸虫病。”这是余江县有关血吸虫病的首次明确文字记载。

在鄱阳,通过建国初(1958~1959 年)对一些年龄在 60 岁以上的疫区老人的访问,乐亭乡 84 岁老人称其父亲死于“大肚病”,又一位城郊乡童区村 77 岁老人说其到童屈村做童养媳时即有“大肚病”死亡,证实流行血吸虫病的疫区在 120 多年前就有“泡肚”(即晚期血吸虫病)的发生,到解放时已十分严重。另《波阳文史资料》记载,根据老年人的追忆,至少距今 170 年,该县就有泡肚。即便以 Faust. E. C S Moleney 1924 年首次在波阳发现血吸虫病人作为始,波阳血吸虫病流行史也有 85 年了。

广丰县血吸虫病究竟何时开始,查无确实史料。据《广丰县文史资料》记载大约有二百年的历史,这与该县 1987 年的县志记载吻合。该县县志称,1957 年血防专业人员在大南区塘狮乡调查出该地距今二百多年前(清乾隆年间)已有此病。1984 年 12 月的调查则证实大南乡茅姜坞在清代咸丰年间(1851~1861)流行血吸虫病。另据老中医韩松灵讲,庄腾的父亲庄恭安(1868~1941)青年时期,便用控涎丹备急丸给大南一带人医治大腹病。控涎丹备急丸是中医泻药剂,具有泻腹消水作用,是当时医治大腹病的主药。另 1980 年代末由吴村乡西山底村,幸存晚期血吸虫病患者,80 岁老人林维柳回忆:他 7 岁时,已亲眼见到村里有 5 人死于大腹病,他的祖父以及他的大哥、二哥都是得大腹病死的。这证实 1914 年施村、吴村一带,大腹病已相当严重,距今 90 余年。

血吸虫病在玉山县的流行,由《玉山县志》记载,早在清末,据民间传说,古城地带就有类似痢疾的病症流行,百人中约有患者 13~14 人,猜测为血吸虫病。另记载民国十九年(1930),从浙江省开化县迁居古城上洋坂村的 3 个居民首先患有大肚子病。此后,大肚子病人逐年增加。

万年县血吸病情道光壬辰年传入,然未见防治记载。1959 年我省对万年县流行较为严重的白家坂杨家的老年群众进行血吸虫病流行史的访问调查,群众回忆老辈流传的传说,认为老壬辰年(1831

年)杨家村发过人瘟,且听说吐血痢血而死的人多。从老人们的描述此次人瘟是血吸虫病的可能性较大,由此推断万年县血吸虫病流行距今有175年之久。

武宁县血吸虫病俗称大肚子病,又称水肿胀,据1990年的《武宁县志》记载,一百多年前开始流行。

血吸虫病在南昌市的流行年代,目前也无确切文字记载。据同治版《安义县志》第十卷“孝友篇”第20页记载:“周祥德,安义县人(即建国后龙津丁湖一带,建国后查明为疫区),家贫母病蛊,诸药无效。时年十七,割股啖之,延岁余,乃卒”。同篇第22页又载:“杨著,依里人(笔者注:建国后万埠、长埠一带,建国后查明为疫区)……因父病即于蛊”。以上记载年代均为康熙十二年(1683),若记载中的蛊病就是中医书中认识的血吸虫病,那么血吸虫病在南昌市,在安义县的流行年代距今有320余年。若以民谣分析,1958年~1959年在黄洲乡黄堰村调查,该村流唱民谣“百年以前是枝花,密密麻麻上百家,百年之后传病害,人亡家破剩五家”。这里似乎只谈疾病的危害,再从该县龙津镇群众形容疾病的歌谣中便可大致推测为血吸虫病了。歌谣说:“用了堤堰水,抱肚哩泡身体,台山港湾湾,抱肚哩上乌龟山”(此处堤堰、台山港是有钉螺的灌溉渠名称;抱肚哩是群众给晚期血吸吸病人起的别号;乌龟山指当地的坟墓山)以此为据,安义县约在150年前就开始流行血吸虫病了。而依据建国后的《安义县志》,该县血吸虫病早在200多年前就已流行。

南昌县血吸虫病流行于何年也无从查考,但根据建国初对南新、蒋巷、泾口、塘南四个疫区公社的调查可知,此病流行已百余年。而在1958~1959年对江西血吸虫病流行史的访问中,该县五丰乡严村的76岁蔡婆婆说,她的祖父是“泡肚子”死的,推论该县血吸虫病大概流行年代距今约有140余年。

进贤县血吸虫病流行,据疫区老人回忆,从清咸丰八年以后,官溪村、金坑村、健武村在血吸虫的危害下开始由盛转衰。

新建县的流行起源同样无确切记载,据建国后对新建县松湖乡的调查,自明正德年间,锦江改道后,杉田村原有90余户500余人,多因患大肚子病而致死。

在吉安专区,血吸虫病在万安县境内开始流行的时间无从查究。血吸虫病在泰和的流行,据新《泰和县志》的记载,清朝末年,马家洲一带就有血吸虫病的流行,甚至从清光绪中期起。

在赣州行政区,血吸虫病只孤立流行于上犹县,流行开始于何时无法得知,新《上犹县志》也没有记载。但依据1958~1959年在上犹的访问调查,一农

民说其父亲50年前死于大肚病,另一受访农民也说他父亲40年前死于同样的大肚子病,由此似乎可推论血吸虫病在上犹的流行时间据今大约有百年。

以上是江西省各疫区县市血吸虫病流行史的粗略概述,由于主客观原因,我们已难界定血吸虫病在我省各疫区流行的确切时间,尤其是民国以前我们只能得出的是推论性结果,但笔者认为,这并不妨碍我们得出以下结论:第一,血吸虫病在我省流行久远只是相对而言。据考古论证,我国血吸虫病流行至少已有两千多年的历史。但我们不能亦主观臆断江西的血吸虫病有如湖北、湖南等省份可追溯到西汉时期。一方面,经过上述梳理,江西各疫区县市的血吸虫病流行起源多无确切记载,缺少文字考证。另一方面,从血吸虫病的流行特点来看,血吸虫病流行范围广、易感人群和动物普遍,加之江西的特殊地理环境,古代认识不足,医疗水平有限,朝廷应对不力,极易造成血吸虫病的大规模流行,给地方社会、村落带来致命性打击的危害。但事实上,我们从明清以前的古县志中鲜少发现此类材料,也罕少发现各级地方政府或地方社会应对血吸虫病的痕迹。对于这样一种危害严重,甚至于毁家灭族,村落凋零,给目击者或后人造成难以弥合伤痛的病症,倘若它存在而时人或后人却没有留下只言片语似乎不合情理。与之相反,在县志、族谱、碑文、文史资料、血防志以及报刊杂志以及民间歌谣、传说等对于明清以及之后的民国、新中国建国初期血吸虫病的记载则汗牛充栋:

《永修县志》:“民国时期,天花、霍乱、麻疹时有发生,血吸虫、血丝虫颇为猖獗”。

《都昌县志》:“都昌受血吸虫危害……至建国前夕百余年间,湖区人民无不深受其害,尤以民国18年(1929年)至民国38年(1949年)为甚”。

《德兴县志》:“该病(血吸虫病)始于晚清而猖獗于民国”。

由此推之,血吸虫病在我省流行久远只是相对而言,其最早出现的时间不会早于唐朝,甚至更晚,尤在明清时期出现可能性较大。而血吸虫病在江西大规模的流行蔓延应为民国及新中国建国初期。换言之,江西血吸虫病在中华民国时期及新中国建国初期是疫情最为严重时期。

第二,至目前为止,从笔者所遍搜的材料中得知,江西血吸虫病出现的确切的记载、最早的时间应该为1909年,即《江西卫生志》所记录的兰白悌(Lam bert)氏在九江调查所证实的风疹热为血吸虫病之例,距今100年。

(收稿日期:2009-05-02 责任编辑:李丛)