

安痛定致颜面部扁平苔藓 1 例

★ 傅杰¹ 刘静¹ 喻桃² (1. 江西中医学院科技学院 南昌 330025; 2. 北京市朝阳区第二医院 北京 332200)

关键词: 安痛定; 扁平苔藓

中图分类号: R 756.9 文献标识码: B

1 病案资料

患者,男,19岁,左额部、左侧鼻翼、下唇紫红色斑丘疹3个月。患者3个月前因高烧(39.5℃)肌注安痛定1支后,左侧额部、左鼻翼处起米粒大红色丘疹,破溃后皮疹逐渐扩大,形成两个五分币大小、边界清楚的紫红色斑丘疹,中央稍凹陷,上覆少许鳞屑,有蜡样光泽。并可见下唇环状红斑,伴干燥黏着性鳞屑。患者无其他自觉不适。在当地医院怀疑药疹予以治疗而无效,遂来我院就诊。既往史、个人史无特殊。患者姐姐1年前因发烧服用解热镇痛药后,下唇部出现丘疹,后经病理检查诊为“扁平苔藓”。体检:一般情况良好,系统检查未见异常。皮肤科情况:左侧额部、左鼻翼处各见1个5分币大小的紫红色斑丘疹,边界清楚,中央稍凹陷,上覆少许黏着性鳞屑,有蜡样光泽。下唇可见一环状红斑,伴干燥脱屑,口腔溃疡(-)。组织病理检查:表皮点状角化不全,毛囊角栓,棘层增厚,基底细胞灶性液化,真皮浅层、血管周围大量淋巴细胞、组织细胞及噬色素细胞浸润。诊断:扁平苔藓。

2 讨论

扁平苔藓(lichen planus LP)是一种发生于皮肤、毛囊、和黏膜的常见的瘙痒性、炎症性疾病。本病的特征是皮损为红色或紫红色扁平丘疹或斑丘疹,多角形或圆形,边界清楚,表面有蜡样光泽,上有灰白色斑点或网状白色条纹(Wickham纹)。损害的好发部位是腕屈侧、躯干、股部、胫部、手背和龟头。本病面部受累少见,通常限于眼睑或唇部,或两处同时受累^[1]。本例患者前额、鼻翼、下唇三处同时受累,临床少见。

扁平苔藓常由药物引起,已报道引起扁平苔藓样药疹的药物有抗疟药、砷剂、金剂、奎尼丁、青霉素、氯磺丙脲、噻嗪、酚噻嗪、对氨基甲酸、脑益嗪、脑复新、 β 阻滞剂、降压药、血管扩张药、脑代谢激活药、非甾体抗炎药。也有报道称中药制剂雷公藤或地奥心血康可导致扁平苔藓^[2]。本例患者因肌注安痛定(主要成分:氨基比林、非那西丁、苯巴比妥,为一种非甾体类抗炎解热镇痛药)后,出现颜面部扁平苔藓;其姐姐也曾因服解热镇痛药而出现下唇扁平苔藓,再一次证实非甾体抗炎药可引起本病。同时也提示,扁平苔藓可能有家族倾向。

药物引起的扁平苔藓与特发性扁平苔藓在临床和病理有诸多相似,两者鉴别较困难,前者常有明显的用药史。如果皮损出现在曝光部位,有鳞屑而不是肥大,或融合或呈播散性,这些临床特征在特发性扁平苔藓中不常见,应怀疑为药物引起^[1]。病理上,药物引起的扁平苔藓可出现嗜酸粒细胞、表皮破裂、角质层和颗粒层出现胶样小体,而特发性扁平苔藓则无此病理特点^[3]。

药物引起的扁平苔藓在治疗上常较特发性扁平苔藓容易,一般给予停药,再配合小剂量的激素、抗组胺药等常可在半年内治愈。

参考文献

- [1]徐世正. 安德鲁斯临床皮肤病学[M]. 北京:科学出版社,2004:258.
- [2]王静,范志莘,张美华. 扁平苔藓样药疹1例[J]. 临床皮肤病学杂志,1995,5:245.
- [3]黄东辉,靳培英. 8例苔藓样药疹的临床病理分析[J]. 临床皮肤科杂志,1997,3:155-157.

(收稿日期:2009-05-12 责任编辑:周茂福)