

《本草纲目拾遗》中蒲包草等药物的考证

★ 孙晖 姚振生 (浙江中医学院 杭州 310053)

关键词:《本草纲目拾遗》;蒲包草;天灯笼草;山海螺;毛叶仙桥;兔儿一支箭;镜面草;本草考证

中图分类号:R 282.71 文献标识码:A

《本草纲目拾遗》^[1]是清代医家赵学敏经多年编写而成的一部集本草大成之作。全书分十卷,载药 900 余种。此书收载药物以《本草纲目》中未收入的药物为主,有的纲目已收载,但主治及药物性状等记述不详的则加以补充说明,对其记载有讹误的,加以修正。此书是广大医学工作者的重要参考书,具有极大的参考价值,对我国中医药学的发展起了巨大的推动作用。《本草纲目拾遗》中收载的被子植物约有数百种,本文对其中的蒲包草、天灯笼草、山海螺、毛叶仙桥、兔儿一支箭、镜面草等药物逐一进行考证。现简介如下:

1 蒲包草(卷三草部上)

书引《新语》云:“水蜡烛,草本,生野塘间,秋杪结实,宛与蜡烛相似。有咏者云:‘风摇无弄影,煤具不燃烟。’以其开花结实,俨似蜡烛故名。芦苇荡中颇多,土人采其实,以冶金刃刀伤止血用。”引汪连仕《采药书》:“蒲萼即蒲草。南人呼莎草,北人呼板枝花,结实为鬼蜡烛,其粉为蒲黄。”与《中国高等植物图鉴》^[2]第 5 册中水烛核对,其特征“多年生沼生草本。高 1.5~3 米。叶狭条形,宽 5~8 mm,稀可达 10 mm,穗状花序圆柱形,长 30~60 cm,雌雄花序不连接:雄花序在上,长 20~30,雄花有雄蕊 2~3 枚;雌花序在下,长 10~25,毛与小苞片等长而比柱头短,小坚果无沟”等特征,与《本草纲目拾遗》中记载

的蒲包草极为相似,书中记载的“冶金刃刀伤止血”与《新华本草纲要》^[3]第 3 册的蒲黄具行血消瘀、止痛及外用能止血等功效核对,极为相似,所以此植物为香蒲科的水烛 *Typha angustifolia* L.

2 天灯笼草(卷四草部中)

因其果实像灯笼,故以灯笼为名。书曰:“一名山瑚柳,形似辣椒而叶大,高本尺许,开花白色,结子(实指果实)如荔枝,外空,内有绿了(实指未成熟的果实),经霜乃红。京师呼为红姑娘。”上述特征与《中国高等植物图鉴》^[2]第 3 册中酸浆的特征进行对比,其“高 20~100 cm,茎直立。叶在茎下部互生,在上部成假对生,长卵形,宽卵形或菱状卵形,长 5~15 cm,宽 2~8 cm,顶端渐尖,基部偏斜,全缘,波状或有粗齿,有柔毛。花萼钟状,花冠辐状,白色。浆果球形,橙红色,被膨大的宿萼所包,基部稍内陷,橙红色”等特征,与酸浆很一致。其专治咽喉肿与《新华本草纲要》^[3]第 3 册所载的酸浆的临床功效完全一致,故此植物为茄科的酸浆 *Physalis alkekengi* L. var. *francheti* (Mast.) Makino.

3 山海螺(卷四草部中)

书曰:“山海螺,生山溪涧滨湿地上,叶五瓣,附茎而生,根如狼毒,皮有皱旋纹,与海螺相似,而生于山,故名,虽生溪畔,性却喜燥,枝叶繁弱,可以入盆玩。”引《百草镜》云:“生出土,二月采,绝似狼毒,唯

开发利用,但有关其化学、药理等现代研究报道较少见,有待进一步深入研究。

鹰爪枫属在我省亦有较丰富的资源,该属植物的形态特征与野木瓜属极为相似,其根、茎在民间入药应用时,基本等同野木瓜属;因而对鹰爪枫属植物是否能和野木瓜属植物等同入药使用,有待化学、药理及临床方面的研究,以确保资源的正确使用。

木通属植物入药,始载于《神农本草经》,以后历代诸本草记载的木通亦主要来源于木通属,临床应用中未见毒性记载。作为一种具有悠久药用历史的中药资源,我国应尽快恢复木通属植物作为正品木

通流通使用的历史地位,以代替目前被禁用的马兜科植物。我省气候环境条件非常适宜该类植物生长,因而应抓住机遇,加大研究开发力度,以便我省这一丰富的植物资源能够得到充分合理的利用。

参考文献

- [1]傅立国.中国高等植物(第三卷)[M].青岛:青岛出版社,2000. 583
- [2]《中华本草》编委会.中华本草(3)[M].上海:上海科技出版社,1999. 329
- [3]吴征益.新华本草纲要(第一册)[M].上海:上海科技出版社,1988. 163

(收稿日期:2004-03-01)

皮疙瘩,掐破有白浆为异。其叶四瓣,枝梗蔓延,秋后结了(实指果实)如算盘珠,旁有四叶承之。治肿毒,取汁和酒服。渣敷患处……治肠痈便毒,脏毒乳痈皆效。”上述特征与《中国高等植物图鉴》^[2]第4册的羊乳比较,其“根圆锥形或纺锥形,根表具多数环状皱纹,尚有小突起。草质环绕藤本,具白色乳汁。茎上叶小互生,菱状狭卵形。枝上叶3~4轮生,花冠黄绿色或紫色。蒴果具宿存花萼,种子具翅。生于山地沟边,溪边或林缘灌丛中。常分布于华南、西南至东北等地”等特征,基本上与山海螺相似,另据《本草拾遗辑释》载:“羊乳根,似茅苎而圆,大小如拳,上有角节。剖之有白汁。”也与山海螺相似。《名医别录》曰:“羊乳,味甘温,无毒主治头眩痛,益气,长肌肉”与《新华本草纲要》^[3]第一册载“养阴润肺,排肿解毒的功能,用于久病体虚,产后缺乳,肺脓疡,乳痈,疮疥肿,淋巴结核,毒蛇咬伤”的功用大致相同。所以此种植物为桔梗科的羊乳 *Codonopsis lanceolata* Benth. et Hook. f.

4 毛叶仙桥(卷五草部下)

因其在五月时,茎蔓延生长开去,两端都抓地生根,形似桥状,又因其叶片有毛,故称其为毛叶仙桥。书引《百草镜》云:“春月发苗,叶狭尖粗涩,微有毛,三月开花碧色,至五月间,其茎蔓延,粘土生根,两头如桥故名。散风火,利湿热,治白火丹疥疮,涩精。”引李氏《草秘》云:“仙桥草,形似桥,倒地生根,叶似柳,厚背紫色者多,秋开紫花一条(实为短穗状花序)。”上述特征与《中国高等植物图鉴》^[2]第4册中毛叶腹水草的特征核对,其“除花冠外全体密被多细胞长柔毛。茎圆柱形细长,倾卧,顶端着地生根。叶互生,具短柄,叶片卵形至椭圆形,顶端渐尖,边缘有三角形锯齿。花冠紫色,筒状,长6~7 mm”等特征与毛叶腹水草大致相似,其临床功效“散风火,利湿热,治白火丹疥疮,涩精”与《新华本草纲要》^[3]第3册所载毛叶腹水草“有清热解毒,利水消肿,散瘀止痛的功能。用于肺热咳嗽,肝炎,水肿”等功用也十分相似,所以此种植物为玄参科的毛叶腹水草 *Veronicastrum axillare* (Sieb. et Zucc.) Yamazaki-*Botryopleuron axillare* (Sieb. et Zucc.) Hemsl.

5 兔儿一支箭(卷五草部下)

开花时,每一枝只有一朵花,所以叫一支箭,又因为叶子像兔耳,所以名为兔儿一支箭。书曰:“生阴山脚下,立夏时发苗,叶布地生,类兔儿形,叶厚,边有黄毛软刺,茎背有黄毛,寒露时抽心,高五寸许,上有倒刺而软,印花(实为花序)也。每枝只一花(实

指花序),故名一支箭。”引《百草镜》云:“兔儿一支箭,爷如橄榄形,边有针刺,只七八叶,贴地生,八月抽茎,高近几许,花(实为花序)如柏穗而有萌刺,茎叶有毛,七月采。”上述特征与《中国高等植物图鉴》^[2]第4册的毛大丁草的特征核对,其“密生白色绵毛。叶基生,有短柄,矩圆形或倒卵形,顶端钝圆;基部楔形,全缘,幼时上面有白毛,下面密生灰白色绵毛。花茎单生,直立长15~40 cm,有淡褐色绵毛,头状花序单生于花茎顶端,直径约35 cm,总苞片2层,条状披针形,外层稍短,背面密生淡褐色绵毛。”等特征,基本上与毛大丁草相似,其临床功效与《新华本草纲要》^[3]第3册中毛大丁草的功效对照,大致相似。故该植物应为菊科的毛大丁草 *Piloseloides hirsuta* (Forssk.) C. J. Jeffr. ex Cufod-*Gerberapiloseloides* (L.) Cass.

6 镜面草(卷五草部下)

书引《滇南志》曰:“出滇中,能通血脉。按:此草今处处有之,多生阶砌石畔,叶如指面大而圆,其边微作碎齿。叶面光如镜,深绿色,土人呼之嘻儿草,又名地连线。不见开花,止见叶而已,亦呼镜面草。其功效治肺火结成脓血痈疽,月闭。”上述特征与《浙江植物志》^[4]第二册的天胡荽特征作比较,其“常生于山坡,路旁潮湿处或村园石桥阶梯裂缝中等处,茎细长匍匐,节上生不定根,叶片圆形或肾圆形,长0.5~2 cm,宽0.5~2.5 cm,常具五裂片,每裂片又2~3浅裂,裂片边缘有圆钝尺,叶两面无毛,具光泽。花小,白色,双悬果心状圆形,主棱和中棱明显,成熟时有多数小紫红色斑点”等特征与书中描述的镜面草的特征相似。书中“……不见开花,止见叶而已,亦呼镜面草。”天胡荽开的花很小,而且是白色的,不被人们注意,所以人们认为此植物不开花,只有叶片,因叶片两面其光泽,如一面小镜子,故人亦称其为镜面草。书中的主治功效与《新华本草纲要》^[3]第1册中天胡荽的功效:清热利湿、祛痰止咳等相似。综上所述该种植物镜面草应为伞形科的天胡荽 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam.

参考文献

- [1]清·赵学敏, 阎冰等校注. 本草纲目拾遗[M]. 北京:人民卫生出版社, 1983
- [2]中科院植物研究所主编. 中国高等植物图鉴(第三、四、五册)[M]. 北京:科学出版社, 1974, 1975, 1976
- [3]江苏植物研究所等编. 新华本草纲要(第一、三册)[M]. 上海:上海科技出版社, 1988, 1990
- [4]浙江植物志编委会. 浙江植物志(第二册)[M]. 杭州:浙江科技出版社, 1992

(收稿日期:2004-04-12)